Комбинация шкал Spetzler-Martin и Lawton-Young

Система классификации артериовенозных мальформаций головного мозга

Шкала Spetzler-Martin	Баллы	Дополнительные признаки Lawton-Young
По размеру:		Возраст:
менее 3 см	1	менее 20 лет
3-6 см	2	20-40
более 6 см	3	более 40 лет
По локализации:		Кровоизлияние в анамнезе
вне функционально-значимой зоны *	0	Нет
в пределах функционально-значимой зоны	1	Да
По дренированию крови:		Размытость АВМ:
Нет глубоких дренажных вен**	0	Да
Есть	1	Нет



* Функционально значимые зоны: сенсомоторная, речевая, зрительная кора, гипоталамус, таламус, внутренняя капсула, ствол мозга, ножки и глубокие ядра мозжечка.
** Дренаж АВМ считают глубинным, если отток крови хотя бы по одной из вен происходит в вену Галена, внутренние вены мозга, базальные вены Розенталя и прецентральные мозжечковые вены.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:

1. Отдельно для шкалы Spetzler-Martin:
1–2 балла — АВМ имеет низкий риск хирургического лечения;
3 балла — промежуточный;
4–5 баллов – высокий.

2. Для комбинации шкал:
2–6 баллов — низкий риск хирургического лечения;
7–10 баллов — высокий.

Источник: Клинические рекомендации Минздрава РФ «Краниальные мононейропатии у взрослых», 2024

КЛУБ НЕВРОЛОГОВ
neurology-club.ru