

Резистентная и рефрактерная мигрень

Диагностические критерии



Резистентная мигрень	Рефрактерная мигрень
<p>Может быть диагностирована при соблюдении всех следующих критериев:</p> <p>А. Установленный диагноз:</p> <p>1.1 Мигрень без ауры и/или</p> <p>1.2 Мигрень с аурой или</p> <p>1.3 Хроническая мигрень в соответствии с критериями МКГБ-3.</p> <p>В. Изнуряющая головная боль* продолжительностью ≥ 8 дней в месяц в течение ≥ 3 месяцев.</p> <p>С. Неэффективность и/или противопоказания к применению препаратов 3-х классов с доказанной эффективностью для профилактики мигрени, при надлежащей дозе и продолжительности лечения.</p>	<p>Может быть диагностирована при соблюдении всех следующих критериев:</p> <p>А. Установленный диагноз:</p> <p>1.1 Мигрень без ауры и/или</p> <p>1.2 Мигрень с аурой или</p> <p>1.3 Хроническая мигрень в соответствии с критериями МКГБ-3.</p> <p>В. Изнуряющая головная боль* продолжительностью ≥ 8 дней в месяц в течение ≥ 6 месяцев.</p> <p>С. Неэффективность и/или противопоказания ко всем профилактическим курсам лечения мигрени с доказанной эффективностью, назначаемым в надлежащей дозе и продолжительности.</p>

*Изнуряющая головная боль – головная боль, вызывающая серьезные нарушения повседневной деятельности, несмотря на применение обезболивающих препаратов с установленной эффективностью в рекомендуемой дозе, принимаемых в самом начале приступа головной боли; неэффективность ≥ 2 триптанов.

Источник: Консенсус Европейской федерации головной боли 2020

Sacco, S., Braschinsky, M., Ducros, A. et al. European headache federation consensus on the definition of resistant and refractory migraine. J Headache Pain 21, 76 (2020).
<https://link.springer.com/article/10.1186/s10194-020-01130-5>