


# Дифференциальная диагностика тригеминальных автономных цефалгий



Показатель	Кластерная головная боль	Эпизодическая пароксизмальная гемикрания	Хроническая пароксизмальная гемикрания	SUNCT/SUNA	Невралгия тройничного нерва	Гемикрания континуа
Пол/женщины: мужчины	1:3	1:1	2:1	от 1:8 до 1:1,5	3:2	2:1
Характер боли	Сверлящая/колющая	Пульсирующая	Пульсирующая/сверлящая	Колющая	Колющая	Пульсирующая/колющая при усилении
Интенсивность боли	Очень сильная	Очень сильная	Очень сильная	Средняя	Очень сильная	Основная –средняя, при усилении –тяжелая
Локализация боли	Лобно-височная	Лобно-височная	Лобно-височная	Лобно-височная	Вторая и третья ветви V пары	Лобно-височная, билатеральная
Количество атак в день	1–8	2–30	1–40	от 6–77 до 100	От нескольких до множества	Ежедневная в 50%
Длительность атак	15–180 мин	3–30 мин	2–25 мин	5–250 с	Менее 1 с	От 30 мин до 3 дней
Вегетативные симптомы	Присутствуют	Присутствуют	Присутствуют	Присутствуют	Отсутствуют	Присутствуют
Циркадная ритмичность	+	–	–	–	–	–
Алкоголь-триггер	++	(+)	(+)	–	–	(+)
Нитроглицерин-триггер	++	(+)	(+)	–	–	–
Кожные триггеры	–	–	–	++	++	–
Ажитация/невозможность пребывания в покое	90%	80%	–	65%	–	69%
Мигренозное сопровождение атак, %:						
тошнота	50	40	25	–	53	–
фотофобия	65	65	25	–	74	–
фонофобия	65	65	25	–	79	–