

Частота дисфагии при неврологических заболеваниях

Нарушение	Частота	Примечание
Супратенториальный инфаркт	50% в острой фазе	Обычно хорошо разрешается
Инфратенториальный инфаркт (ствол или мозжечок)	До 80% в острой фазе	Разрешение зависит от локализации
Мультиинфарктный синдром	Высокая	Псевдобульбарный паралич низкая тенденция к разрешению
Мозговое кровоизлияние	Вариабельная	Зависит от локализации и распространенности поражения и уровня сознания
Болезнь Паркинсона	50%	Нарушение подвижности языка, задержка глотания
Деменция	Очень высокая	Нарушение питания и дефицит жидкости часто приводят к вторичным осложнениям
Рассеянный склероз	30–40% в острой фазе	Зависит от степени инвалидизации
Тяжелая травма головы	50–60% в острой фазе	Тенденция к улучшению
Центральный понтинный миелолиз	Очень высокая	
Боковой амиотрофический склероз	25% в начальной фазе	В перспективе 100%
Спинобульбарная нейропатия (болезнь Кеннеди)	Очень высокая	
Синдром Гийена-Барре	Высокая	Риск немой аспирации, особенно при синдроме Миллера-Фишера
Критическое состояние при полинейропатии или миопатии	До 80% при длительной искусственной вентиляции	
Синдром Ламберта-Итона	24–34%	Сухость во рту
Окулофарингеальная мышечная дистрофия	Всегда	
Миозит	Высокая	Полимиозит, дерматомиозит, миозит с тельцами включения