

# ТЕСТ ДЛЯ РУКИ ФРЕНЧАЙ

## The Frenchay Arm Test

Тест Френчай предназначен для того, чтобы определить насколько больная рука приспособлена к бытовой жизни и участвует в ней.

Инструкция:

- ◎ Исходное положение для каждого задания: сидя за столом, руки лежат на коленях
- ◎ Все задания выполняются пораженной рукой
- ◎ За каждое успешно выполненное задание больной получает 1 балл (максимум 5 балл)
- ◎ За невыполненное – 0 баллов
- ◎ Если пациент находится без сознания, то он получает 0 баллов

№	Задание	Балл
1	Удержать линейку и с ее помощью начертить линию, держа карандаш в другой (непораженной) руке. Задание считается выполненным успешно, если линейка удерживается стабильно	
2	Взять в руку цилиндр диаметром 12 мм и длиной 5 см, поставленный вертикально на расстоянии 15–30 см от края стола, поднять его на высоту около 30 см и затем опустить на место, не уронив при этом	
3	Взять стакан, наполовину наполненный водой, поставленный на расстоянии 15–30 см от края стола, отпить воды и поставить стакан на место, не расплескав при этом воду	
4	Снять, а затем установить на прежнее место бельевую прищепку, укрепленную на вертикальном колышке длиной 15 см и диаметром 1 см. Колышек укреплен на квадратной дощечке (длина стороны 10 см), расположенной на расстоянии 15–30 см от края стола. Пациент не должен уронить прищепку или колышек	
5	Причесать волосы (или имитировать причесывание). Пациент должен расчесать волосы на макушке, на затылке, с правой и левой стороны	

Источник: Heller A, Wade D, Wood V, Sunderland A, Hewer R, Ward E. Arm function after stroke: measurement and recovery over the first three months. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 1987; 50(6): 714 - 719. doi: 10.1136/jnnp.50.6.714