

Шкала антихолинергической нагрузки АСВ (Anticholinergic Cognitive Burden Scale, ACB-Scale)



Рейтинг лекарственных средств, вошедших в шкалу в соответствии с их антихолинергической активностью:

Уровень 1 – имеются потенциальные антихолинергические свойства, о чем свидетельствует экспериментальные исследования по оценке связывания лекарственного средства с М-холинорецепторами;

Уровень 2 – в клинических исследованиях антихолинергические нежелательные побочные реакции иногда отмечались при применении лекарственного средства, как правило, в высоких дозах;

Уровень 3 – явные антихолинергические нежелательные побочные реакции (в клинических исследованиях), вплоть до делирия, при назначении препаратов в средних дозах.

Уровень 1 (1 балл за каждый препарат из списка)	Уровень 2 (2 балла за каждый препарат из списка)	Уровень 3 (3 балла за каждый препарат из списка)
Алпразолам Арипипразол Атенолол Каптоприл Цетиризин Хлорталидон Кодеин (входит в комбинированные ЛП, зарегистрированные в РФ) Безвременника осеннего семян экстракт Дезлоратадин Диазепам Дигоксин Дипиридамол Фентанил Фуросемид Флувоксамин Галоперидол Гидрокортизон Изосорбида динитрат Левоцетиризин Лоперамид Лоратадин Метопролол Морфин Нифедипин Преднизолон Ранитидин Рисперидон Теофиллин Гидрохлоротиазид+Триамтерен Венлафаксин Варфарин	Амантадин Белладонны листьев экстракт Карбамазепин	Амитриптилин Атропин Хлорфенамин (входит в комбинированные ЛП, зарегистрированные в РФ) Хлорпромазин Клемастин Кломипрамин Клозапин Доксиламин Гидроксизин Метоклопрамид Оланзапин Пароксетин Перфеназин Кветиапин Тиоридазин

Предполагается, что каждое увеличение общего балла АСВ на один пункт приводит к снижению балла MMSE на 0,33 пункта в течение 2 лет. Кроме того, каждое увеличение общего балла АСВ на один пункт коррелирует с увеличением риска смерти на 26%.